

**ONDERZOEK SLOKDARM, MAAG- EN TWAALFVINGERIGE
DARM**
(GASTROSCOPIE)

ONDERZOEK SLOKDARM, MAAG- EN TWAALFVINGERIGE DARM (GASTROSCOPIE)

OESOPHAGO-GASTRO-DUODENOSCOPIE

Een oesophago-gastro-duodenoscopie, kortweg ook gastroscopie genoemd, wordt verricht om informatie te krijgen over slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een soepele buigbare slang, de gastroscop, die via de mond wordt opgeschoven naar de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Het slijmvlies kan nauwkeurig worden bekeken. Zonodig kunnen weefselstukjes worden weggenomen voor verder onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Gemiddeld duurt de scopie 10 tot 15 minuten.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dat wil zeggen: u mag niet meer eten, drinken of roken vanaf 24.00 uur de avond voor het onderzoek. Als u 's-middags een afspraak heeft mag u voor 09.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. Onder licht ontbijt wordt bedoeld: thee met beschuit.

Indien u medicamenten gebruikt overleg dan met uw behandelend arts of u deze voor het onderzoek mag innemen. Als u een kunstklep van het hart heeft kan het nodig zijn voor het onderzoek antibiotica toe te dienen, wanneer er bipten worden genomen. Wanneer u suikerziekte heeft spreek dan het onderzoek zo vroeg mogelijk af. Regel het insulinegebruik met uw dokter.

Bloedverdunnende middelen dienen 7 dagen voor het onderzoek te worden gestopt.

Het onderzoek

Voordat het onderzoek begint:

- Eventuele gebitsprothese uitdoen
- Uw bril afzetten
- U krijgt eventueel een bekertje anti-schuimdrank
- De keel wordt verdoofd met een spray
- Daarna gaat u op uw linkerzij liggen
- U krijgt een plastic ring tussen de tanden ter bescherming van de gastroscop

Door enkele malen te slikken kan de gastroscop worden opgevoerd tot in de slokdarm. Dan volgt het onderzoek zoals eerder beschreven.

In enkele gevallen zal worden besloten om het onderzoek onder verdoving te verrichten. U krijgt dan een infuus waardoor een slaapmiddel kan worden ingespoten. Deze verdoving wordt met name gegeven wanneer een uitgebreider onderzoek noodzakelijk is en waarbij ook een ingreep moet worden gedaan. Wanneer u een slaapmiddel heeft gekregen kunt u niet alleen naar huis maar is begeleiding nodig. Zelf autorijden is niet toegestaan. Observatie op de afdeling dagverpleging is na het onderzoek noodzakelijk.

Na het onderzoek

Het duurt ongeveer 30 minuten alvorens de keelverdoving is uitgewerkt. Zolang moet u wachten totdat u weer normaal gaat eten en drinken. Veelal kan de onderzoeker u direkt een uitslag geven. Echter wanneer weefselstukjes zijn weggenomen worden deze opgestuurd naar het pathologisch laboratorium en krijgt uw behandelend arts later de uitslag. Dit is meestal na 1 week.

Complicaties.

Komen zelden voor. Wanneer een ingreep gedaan moet worden neemt het risico iets toe. Er is dan een kans dat er een nabloeding ontstaat. Deze stopt meestal vanzelf maar een opname in het ziekenhuis kan noodzakelijk zijn.

Het komt zelden voor dat er tijdens de ingreep een gaatje in de slokdarm of maag of twaalfvingerige darm ontstaat (perforatie). Hiervoor moet dan meestal operatief worden ingegrepen.

Als bijwerking van het slaapmiddel dat eventueel gegeven wordt kan ademhalingsdepressie optreden met zuurstoftekort in het bloed als gevolg waardoor zuurstoftoediening noodzakelijk is.

Verdere informatie

Wanneer u vragen heeft over het onderzoek bespreek deze dan met de arts die het onderzoek aanvraagt.

U kunt zich ook tijdens de kantooruren wenden tot de afdeling functieonderzoek:

0115 688742 in locatie De Honte

0117 459275 in locatie Antonius

Uw afspraak

Op.....dag.....om.....uur

0 locatie De Honte: functie onderzoek, route 56

0 locatie Antonius: functie onderzoek, begane grond, route 32

mei 2003

rp 35420