

DAGBEHANDELING

VOOR PIJNBESTIJDING

Locatie De Honte, Terneuzen

DAGBEHANDELING VOOR PIJNBESTRIJDING

Locatie De Honte, Terneuzen

Inleiding

U wordt binnenkort behandeld vanwege pijnklachten. Rekent u erop dat u er een paar uur mee kwijt bent.

De voorbereiding

Thuis hoeft u in principe geen voorbereidingen te treffen. U kunt van tevoren gewoon eten, doch niet een te zware maaltijd.

Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het van groot belang om dit te melden.

Op de behandelingsdag meldt u zich op de afgesproken tijd bij de opnamebalie in de centrale hal van het ziekenhuis. U krijgt daar enkele formulieren mee en u wordt doorverwezen naar afdeling dagverpleging (B0/route 82). De behandeling vindt plaats op de poliklinische operatiekamer. Op de afdeling dagverpleging kunt u zich omkleden.

De behandeling

Nadat de huid gedesinfecteerd is met jodium, krijgt u een injectie met een verdovingsvloeistof. Dit doet even pijn. Daarna wordt juiste plaats gelokaliseerd met behulp van röntgenapparatuur waarna de arts de pijnbestrijding kan toedienen. Het kan een testprik of een behandeling betreffen.

Bij een testprik wordt een zenuwtakje voor enige uren verdoofd, om er achter te komen of hiermee de pijn beïnvloed wordt. Gedurende de tijd dat het zenuwtakje verdoofd is, merkt u dan of uw pijn hiermee verdwijnt of verbeterd. Het resultaat wordt vaak tijdens een belafspreek besproken.

Bij een behandeling wordt de pijngeleiding in een zenuwtakje langdurig of blijvend onderbroken, meestal door middel van warmte.

De nazorg

Na testprik of de behandeling blijft u nog enige tijd in het ziekenhuis om het effect van de testprik te beoordelen, danwel om de plaatselijke verdoving uit te laten werken. Meestal is het niet nodig dat u een bed krijgt, maar kunt u na de behandeling in een stoel zitten of wat rondlopen.

Omdat de verdoving uw rijgedrag kan beïnvloeden wordt aangeraden niet zelf een auto te besturen. Zorg er dus voor dat u begeleid wordt.

Doordat de arts in geïrriteerd gebied heeft gewerkt, kan er geringe napijn ontstaan zodra de verdoving is uitgewerkt. Dit duurt ongeveer één dag. Bijna altijd zal het nodig zijn dat u enkele malen terugkomt voor verschillende behandelingen. Soms verloopt de behandeling zonder succes. In dat geval zal de arts in overleg met u nagaan of een andere behandeling mogelijk of wenselijk is.

Tot besluit

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de behandeling, aarzel dan niet om te bellen naar het secretariaat van de polikliniek pijnbestrijding.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het secretariaat te bereiken tussen 09.00 - 13.30 uur via telefoonnummer

0115 688484 en op woensdag tussen 13.30 - 17.00 uur via telefoonnummer 0115 688683.

U kunt deze nummers eveneens bellen als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen.

September 2002
versionsnummer 2.
RP38534