



Neuscorrectie

Informatie

Een neuscorrectie is een operatieve ingreep ter correctie van de uitwendige vorm van de neus. Deze ingreep kan plaatsvinden om de volgende redenen:

- Om de neus te verkleinen;
- Om de vorm van de neuspunt te verbeteren;
- Een hump van de neusrug te verwijderen en/of
- Een scheefstaande neus recht te zetten.

Bij de meeste neuscorrecties worden bot en kraakbeen verwijderd of van vorm veranderd. De incisies worden vaak aan de binnenkant van de neus gemaakt. Na de ingreep is hier niets van te zien. In sommige gevallen zal gekozen worden voor een incisie in het tussenschot van de neus, waarbij een littekentje enigszins zichtbaar kan blijven. Dit littekentje neemt echter na verloop van tijd steeds meer de kleur van de omliggende huid aan.

Als de plastisch chirurg de neusvleugels verkleint, verwijdert hij stukjes huidweefsel aan de onderkant van de neusvleugels. Hij maakt dan de hechtingen in de plooi tussen de neus en de wangen, zodat ze niet zichtbaar zijn.

Voor de operatie adviseren wij u:

- Altijd aan te geven wanneer u bloedverdunnende medicatie gebruikt;
- Altijd aan te geven wanneer u een pacemaker heeft;
- Altijd aan te geven wanneer u een allergie heeft;
- Acht weken voor en na de operatie niet te roken;
- De dag voor de operatie geen alcohol te drinken;
- Uw sieraden uit te doen voorafgaande aan de operatie.

Preoperatief spreekuur (POS)

Ter voorbereiding op uw operatie is het belangrijk uw lichamelijke conditie goed in kaart te brengen.

De dag van de ingreep

Op de afgesproken dag en tijd wordt u in ZorgSaam verwacht, waar u zich aanmeldt bij de receptie. De ingreep vindt onder algehele narcose, dit betekent dat u nuchter moet zijn (6 uur voor de operatie mag niets eten en/of drinken).

Op de afdeling krijgt u een operatiehemd aan en wordt u verder op de operatie voorbereid. Voor de operatie tekent de plastisch chirurg het operatiepatroon met een watervaste stift op uw neus.

Op de operatiekamer wordt u onder narcose gebracht en wordt de neus geopereerd. De incisie wordt ofwel binnenin de neusgaten gemaakt ofwel in het neustussenschot. Dan kan de plastisch chirurg de neus in de gewenste vorm brengen. Na de operatie worden er neustampons in de neusgaten gebracht en zo nodig een gipsspalkje op de neus gelegd.

De operatie duurt, inclusief voorbereiding, ongeveer anderhalf tot twee uur.

Na de ingreep

Na de operatie wordt u nog een tijdje in de gaten gehouden door de anesthesist en de recovery-verpleegkundige in de ontwaakruimte. Als u goed wakker bent mag u weer naar de afdeling. Wanneer u voldoende hersteld bent mag u dezelfde dag nog naar huis.

U krijgt een nazorgformulier mee naar huis, waarin staat waar u op moet letten en wat u kunt verwachten.

Herstelperiode

U bent onder narcose geweest en hebt een operatie ondergaan. Dat betekent dat u vermoeid zult zijn. Zorg dus dat er iemand is die u thuis kan brengen en die u de eerste dagen kan helpen met de dagelijkse bezigheden in huis. Bij pijn mag u 4 keer daags 1000 mg Paracetamol innemen.

Er kan een forse zwelling na de operatie ontstaan met name van beide oogleden. Deze zwelling duurt enkele dagen tot een week. De ogen kunnen ook blauw worden. De neus zelf is ook gezwollen, deze zwelling kan nog enkele maanden aanhouden.

Na de ingreep adviseren wij u enkele dagen absolute rust te nemen. Afhankelijk van uw werk kunt u daarna rustig gaan beginnen. Wandelen en fietsen zijn na een week weer toegestaan.

Zwaar lichamelijke inspanning is in de eerste maand na de ingreep niet toegestaan evenals zwaar tillen. Contactsporten zijn zeker de eerste paar maanden verboden. Het risico van beschadiging van de neus is hierbij te groot.

Financiële aspecten

De ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten van deze operatie meestal niet. Tijdens het eerste consult kan de plastisch chirurg beoordelen of het zin heeft een vergoeding aan te vragen.

Risico's

De ingreep zal worden uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, in samenwerking met eveneens ervaren, gediplomeerde OK-assistentes, in een goed geoutilleerde behandelkamer, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goede behandeling.

Toch kunnen zeldzame complicaties optreden. Zoals bij iedere operatie kunnen er in het behandelde gebied zwelling en bloeduitstortingen optreden die na verloop van tijd spontaan verdwijnen. Als een nabloeding zich voor doet, moet u nog een keer geopereerd worden waarbij de arts het bloedvatje dichtmaakt. Het risico hierop is groter wanneer u bloedverdunners gebruikt. Wanneer u bloedverdunnende medicatie gebruikt, moet u dit altijd melden aan de plastisch chirurg, het gebruik hiervan moet men voor de operatie staken. Uw plastisch chirurg bespreekt met u hoelang van tevoren dit moet.

Er kan een gestoorde wondgenezing optreden waarbij later een na-correctie nodig kan zijn.

Er kan een tijdelijk verminderd of verlies van het reukvermogen optreden of een langdurig verdoofd gevoel van de neuspunt. Er bestaat kans op een niet geheel symmetrische vorm van de neus.

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan om acht weken voor en na de operatie niet te roken.

Zoals bij iedere operatie kunnen er zich in het behandelde gebied infecties voordoen. De infectie wordt meestal met antibiotica behandeld.

Er kan een allergische reactie ontstaan op de gebruikte verdovingsvloeistof en desinfecteermiddelen.

Toestemming

Bij dit formulier ontvangt u tevens een toestemmingsverklaring; het toestemmingsformulier is een verklaring die u vooraf tekent, waarmee u bevestigt dat u toestemming geeft om de operatie uit te laten voeren en dat u voldoende geïnformeerd bent over de eventuele risico's en complicatie die zich voor kunnen doen. Op aanvraag is de modelregeling arts-patiënt en de klachtenprocedure te verkrijgen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u aan de hand van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie 0115 – 688325 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 12.00uur). U kunt ook kijken op onze website www.plastischechirurgiezeeland.nl of op de website van de NVPC www.nvpc.nl.